INICIO

Por lo general tercer trimestre, pero tan pronto como 5 semanas

Si tu médico no tiene experiencia con la Colestasis del Embarazo, busca a un especialista en Medicina Materno-Fetal.

1-2 embarazos en 1,000 es afectado por ICP.

SÍNTOMAS

- Comezón o picazón intensa en manos, pies, o todo el cuerpo.
- Dolor cuadrante superior derecho
- Orina oscura
- Heces pálidas
- Fatiga/malestar

Un rascador de espalda no detendra el picor.

¡Visita un médico!

IMPORTANTE SABER

- Aunque los ácidos biliares estén inicialmente normales, aún puedes tener ICP.
- Tendrás que repetir los análisis de sangre 1-2 veces cada semana mientras sigas con los síntomas.
- La severidad de la comezón o picazón no se correlaciona con los niveles de ácidos biliares.

⚠ RIESGOS ⚠

Parto prematuro, Problemas respiratorios, Tinción de meconio y Muerte fetal. Aumentan los riesgos con mayores niveles de ácidos biliares.

ICP no parece aumentar el riesgo de cesárea.

DIAGNÓSTICO

1. Pide a tu proveedor de salud un análisis de sangre de ácidos biliares.
2. Acidos Biliares Totales sobre 10 umol/L puede indicar Colestasis Intrahepática del Embarazo.

60% de las mujeres con ICP tienen elevadas las enzimas hepaticas.

10% o menos tienen elevada la bilirrubina.

90% de los casos de ICP severo, tendrán ICP en un embarazo posterior.

ICP

PRUEBAS DE FUNCIÓN HEPÁTICA

Las medidas más importantes en esta prueba son los niveles de las enzimas AST y ALT. Niveles por encima del rango de referencia del laboratorio pueden utilizarse para ayudar a diagnosticar ICP. Estas pruebas están disponibles con más facilidad, y los resultados están listos rápido; a menudo en unas cuantas horas.

DEFINICIÓN

La Colestasis Intrahepática del Embarazo (ICP) es un trastorno hepático del embarazo que hace que los ácidos biliares en la sangre se eleven, y representa riesgo para el feto.

TRATAMIENTO

MEDICACIÓN: ácido ursodesoxicólico (la dosis recomendada es de 600-2000mg al día)

PARTO PREMATURO: Usualmente 36-37 semanas de embarazo, dependiendo del nivel de los ácidos biliares

MONITORES: exámenes de no estrés (NST) dos veces por semana, y perfil biofísico (BPP) semanal.

ICP CARE

Para obtener más información, enlaces a estudios, o apoyo, por favor visita www.icpcare.org/es